مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد–نجم آبادی			
کد سند : **TE-REX-FO-023**	شماره ویرایش : **01**	نام بخش : پذیرش	صفحه : ۱ از ۱
عنوان سند :	**فرم رضایت نامه مطالعهٔ کروموزومی از پرز جفتی**		

اینجانبان: ۱- خانم: سن:

۲- آقـا: سن:

با اطلاع کامل از شرایط و در شرایط بدون استرس زیر مایل به انجام آزمایش کروموزومی از پرز جفتی می‌باشیم. وقت برای هرگونه پرسش و پاسخ برای اینجانبان فراهم بوده است.

۱- حداقل ۱۵ میلی گرم از جفت پاک شده برای انجام آزمایش لازم می باشد.

۲- این مرکز فقط آزمایشات تشخیصی انجام می‌دهد و هیچگونه دخالت و تعهدی نسبت به انجام سقط درمانی ندارد.

بمنظور آرامش خیال اینجـانبان بـویژه مـادر از مسئولین مرکز تقاضـا می‌نـماید آزمایشـات تشـخیص قبل از تولد لازم را از خانم ..... به عمل آورند.

۳- نتیجه بررسی مستقیم ۳-۴ روز بعد از نمونه‌گیری آماده خواهد شد و نتیجهٔ کشت ۲- ۴ هفته به طول خواهد انجامید.

حتی الامکان جواب قطعی با تکمیل برر سی هر دو روش م ستقیم و ک شت داده می شود. در موارد نادری ممکن ا ست که جواب فقط با بررسی مستقیم و یا کشت رد شود که در آن صورت قاطعیت جوابدهی مجموع آن دو را ندارد.

۴- طبق آمار بین‌المللی حدود نیم درصد خطر سقط به دنبال نمونه‌گیری از پرز جفتی وجود دارد.

۵- در مواردی ممکن ا ست احتیاج به خون‌گیری و انجام آزمای شات تکمیلی از والدین با شد که جوابدهی را به تاخیر خواهد انداخت.

۶- احتمال نیاز به تایید جواب مطالعهٔ کروموزومی پرز جفتی با بررسی کروموزومی روی مایع آمنیوتیک وجود دارد که در این صورت توصیه به نمونه‌برداری از مایع آمنیوتیک می‌شود.

۷- ۱-۲ ٪ ممکن اسـت از مطالعهٔ کروموزومی روی پرز جفتی به نتیجه نرسـیم و لازم باشـد مطالعهٔ کروموزومی روی مایع آمنیوتیک انجام شود.

۸- ناهنجاری‌های مادرزادی علل مختلفی دارند. از قبیل عفونت‌های دوران بارداری، بیماری‌های ژنتیک و ... این آزمایش فقط اختلالات کروموزومی را نشان می‌دهد.

۹- در ۱٪ مواقع ممکن اســت آلودگی با ســلول مادری وجود داشــته باشــد از این رو می‌توانید با انجام تســت (MCC کشت) متوجه شوید که سلول‌های کشت شده و کاریوتایپ شده مربوط به سلول‌های جنین و یا سلول های مادری می‌باشد. اگر سلول‌ها مربوط به مادر باشد نمونه گیری مجددتوصیه می‌شود.

لازم به ذکر است که برای کشت مجدد هزینه‌ای دریافت نخواهد شد البته باید توجه داشته باشید که این تست پس از رشد کامل سلولی حداقل بعد از ۱۴ روز قابل انجام می‌باشد.

امضاء خانم امضاء آقا تاریخ: ...../...../.....